



Jophar roztok ke kloktání

Jodovaný povidon má dezinfekční účinky, ničí řadu bakterií, plísni a některé viry. Použit se dá při prvních příznacích škrábání či bolesti v krku. Použití od 6 let věku. Jedná se o koncentrovaný roztok, dávkování 20 kapek do 100ml vody 2-4x denně. Nepoužívat jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon.

Acidum citricum monohydricum Aqua purificata Ethanolum 96% Levometholum Natrii citras dihydr. Povidonum iodatum Propylenglycolum



Jophar roztok ke kloktání s heřmánkovou tinkturou

Jodovaný povidon má dezinfekční účinky, ničí řadu bakterií, plísni a některé viry, heřmánková tinktura působí protizánětlivě. Použit se dá při prvních příznacích škrábání či bolesti v krku. Použití od 6 let věku. Jedná se o koncentrovaný roztok, dávkování 20 kapek do 100ml vody 2-4x denně. Nepoužívat jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon.

Acidum citricum monohydricum Aqua purificata Ethanolum 96% Levometholum Natrii citras dihydr. Povidonum iodatum Propylenglycolum Tinctura chamomillae



Jophar sprej do krku

Přípravek se používá jako doplňková léčba při zánětlivých a infekčních onemocněních v dutině ústní a hltanu - angína, zánět hltanu, zánět mandlí, současný zánět hltanu a mandlí, zánět jazyka a afty, při chirurgických výkonech v dýchacích a polykacích cestách, při prvních příznacích chřipkových onemocnění (škrábání v krku).

Aplikuje se 2 až 4krát denně, v případě potřeby možno aplikovat i častěji (po 4 hodinách) až 3 vstříky vpravo i vlevo nebo přímo na postižené místo, maximálně však 6krát denně. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.

Nepoužívejte přípravek jestliže jste alergický(á) na jodovaný povidon.

Nepoužívejte u dětí do 8 let.

Acidum citricum monohydricum Aqua purificata Ethanolum 96% Levometholum Natrii citras dihydr. Povidonum iodatum Propylenglycolum